

Cobalzan



USO VETERINÁRIO

Ferro - Cobalto - Cobre - Vitamina B12

Fórmula:

Cada mL contém:

Vitamina B12	2,00 mcg
Cloreto de cobalto	1,00 mg
Sulfato de cobre	1,25 mg
Citrato de ferro amoniacal	12,50 mg
Veículo q.s.p	1,00 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.

LEITE - CARÊNCIA ZERO.

SUÍNOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Indicações:

Cobalzan atua como um mineralizante hematínico, indicado na prevenção e correção das anemias microcíticas hipocrômicas, comuns nos animais e provocadas por causas diversas: alimentação carente em micro-elementos (ferro, cobalto e cobre); defeitos de absorção pelas paredes intestinais (nas diarreias, enterites catarrais, etc.); grandes hemorragias ou perdas crônicas de sangue e estados anêmicos provocados por infestações parasitárias.

Recomendado como preventivo nas ocasiões em que o organismo animal requer uma suplementação de nutrientes acima do normal: na prenhez para formar o sangue fetal, no aleitamento, no crescimento, nas convalescenças e acompanhando, como coadjuvante, o tratamento das moléstias anemiantes (babesiose, piroplasmose, anaplasmose, etc.).

Nas carências de cobalto em ruminantes, por via oral, para possibilitar a síntese da vitamina B12.

Modo de Usar:

Por via injetável, em aplicações intramusculares ou subcutâneas.

Não aplicar na veia.

Nas carências de cobalto em ruminantes, administrar por via oral.

Posologia:

USO INJETÁVEL: Animais de grande porte adultos: 10 mL para cada 150 kg de peso corporal, por dose. Máximo de 30 mL. Bezerros, ovinos, suínos adultos: 10 mL por dose. Pequenos animais (leitões, cães, gatos.) - 2 a 5 mL por dose. Fazer 2 aplicações por semana, num total de 5 a 10 aplicações. Como profilático, aplicar 1 dose semanal. Repetir o tratamento, se necessário, após 1 semana de descanso. Nas aplicações de doses de 10 mL ou mais, dividi-las em 2 ou 3 porções e injetar em regiões diferentes do corpo do animal.

USO ORAL EM RUMINANTES: Nas deficiências de Cobalto em ruminantes por defeito nutricional, a aplicação de **Cobalzan** deve ser feita por via oral, nas seguintes doses: Animais de grande porte, adultos - 20 a 30 mL, 2 vezes por semana, diluídos em um pouco de água. Ovinos - 10 mL. Nos tratamentos coletivos, aconselhável o emprego de pistola dosificadora. Cabe ao Médico Veterinário determinar, se necessário, uma dosagem de manutenção, fração da curativa após o desaparecimento dos sintomas clínicos.

Apresentação: Frasco-ampola com 100, 250 e 500 mL.

Conservar em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 0340 em 03/12/76.

Responsável Técnica: Dr^a Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19