




Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979



PRODUTO: Riodeine® Tintura (iodopolividona)

CLASSE: MEDICAMENTOS.

INDICAÇÃO: Demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória (antisepsia da pele). Antisséptico para uso tópico.

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

MODO DE USAR: Uso externo. É indicado na demarcação do campo operatório e na preparação pré-operatória da pele do paciente e da equipe cirúrgica. Aconselha-se espalhar na pele e massagear por 2 minutos. Deixar evaporar o álcool normalmente. Se necessário, repetir a operação.

AÇÃO: É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução alcoólica, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. O emprego do produto para prevenção e tratamento de infecções cutâneas não apresenta o inconveniente de irritações da pele e por ser hidrossolúvel não mancha acentuadamente a pele, sendo facilmente removível em água.

ADVERTÊNCIA: O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos.



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

RESTRIÇÃO DE USO: Neonatos e gestantes, pois pode causar intoxicação pelo iodo.

Evitar o uso prolongado. Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou claras de ovos batidas em água. Em contato com os olhos, lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação médica. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. **AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

APRESENTAÇÕES:

Linha Farma – Não Aplicável.

Linha Hospitalar – 30 mL Alm., 100 mL Alm. e 1 L.

REGISTRO:

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006.

AFE Nº 1.01.520 – 1.

COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL de solução contém:

iodopolividona 10%.....10 g

(equivale a 1% de iodo ativo).

Excipientes.....q.s.p.....100 mL

(BHT, álcool etílico e água purificada).

CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).

Proteger da luz. Proteger da luz. Produto inflamável. Mantenha afastado de fontes de calor ou chama. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos desse produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone do SAC 0800 114288.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

CEATOX - Hospital das Clinicas fone: 0800-0148110

Farmacêutica Responsável: Amanda Deusa de Oliveira Barbosa.

CRF-SP: 77.073

PERIGO



VE012018