



Antiparasitário Externo

Uso Veterinário - Uso Tópico

Para combate e controle de pulgas, carrapatos, piolhos e sarnas

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Fipronil10 g
Veículo q.s.p. 100 mL

PROPRIEDADES

EC-PET® é um pulguicida, piolhicida e acaricida (sarna e carrapato) à base de Fipronil, pertencente à família dos fenilpirazóis. O mecanismo de ação do Fipronil ocorre pelo antagonismo dos receptores do ácido γ -aminobutírico (GABA), bloqueando não competitivamente os canais de cloro, inibindo a função nervosa normal e dividindo os mesmos sítios de ligação dos ciclodienos e t-butil-biciclo-fosforotionatos. O sistema de receptores de GABA é inibidor e age prevenindo o excesso de estimulação dos nervos. Então o bloqueio destes receptores pelo Fipronil interfere na neuromodulação do sistema nervoso central dos insetos e ácaros, levando o parasito à morte por hiperexcitação.

EC-PET® em aplicação única elimina pulgas (*Ctenocephalides felis*), piolho (*Trichodectes canis*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), e sarna otodécica (*Otodectes cynotis*) presente nos cães.

INDICAÇÕES

É indicado na prevenção e controle das ectoparasitoses dos cães causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis*), piolho (*Trichodectes canis*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e sarna otodécica (*Otodectes cynotis*).

EC-PET® é indicado como parte de uma estratégia de tratamento, em aplicações mensais, para dermatites alérgicas à picada de pulgas dos cães (DAPP) e na verminose causada pelo cestódeo *Dipylidium caninum* uma vez que as pulgas são hospedeiras intermediárias deste parasita.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Uso externo para aplicação direta sobre a pele.

1 • CONTROLE DE PULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS - Para o tratamento e prevenção de pulgas, carrapatos e piolhos: Aplicar diretamente sobre a pele do animal a dose recomendada, por via tópica, entre a região da nuca e a base do pescoço à frente das escápulas (DOSE ÚNICA). Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o animal seja alérgico à picada de ectoparasitas (DAPP), ou onde seja necessário o controle de carrapatos.

INSTRUÇÕES DE USO PARA CONTROLE DE PULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS:
Segurar a pipeta verticalmente. Retirar a tampa da pipeta e aplicar todo o conteúdo da mesma diretamente sobre a pele seca do animal, na região da nuca para evitar que o animal se lamba.


É importante afastar os pelos para facilitar aplicação do produto sobre a pele.

Não recomendamos o fracionamento do produto.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleira de couro ou tecido no animal tratado até que o pelo esteja bem seco.

Para animais acima de 20 kg recomendamos administrar o produto em vários pontos no dorso do animal.

OBS.: Logo após a administração do **EC-PET**®, em cães com pelagem escura, poderá aparecer uma área esbranquiçada no ponto de aplicação, que desaparece espontaneamente.



2 • SARNA OTODÉCICA - Para o tratamento do *Otodectes cynotis* deve-se pingar 2 gotas no conduto auditivo com posterior massagem deste. O restante do produto aplicar diretamente sobre a pele do animal entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas. (DOSE ÚNICA).



POSOLOGIA OBEDECER A SEGUINTE TABELA:

De 1 a 10 kg	Uma pipeta de 0,67 mL / cão
De 11 a 20 kg	Uma pipeta de 1,34 mL / cão
De 21 a 40 kg	Uma pipeta de 2,68 mL / cão
Acima de 40 kg	Uma pipeta de 4,02 mL / cão

CONTRAINDICAÇÕES

- Não usar em casos de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos veículos.

PRECAUÇÕES DE USO

- Pesar os animais precisamente antes do tratamento.
- Para animais acima de 20 kg recomendamos administrar o produto em vários pontos no dorso do animal. **(Conforme desenho de instruções de uso).**
- Não aplicar o produto na pele ferida.
- Evitar contato com os olhos dos animais. Em caso de contato acidental, lavar imediatamente com água corrente.
- Animais ou tratadores com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula devem evitar o contato com **EC-PET®**.
- Não fumar e alimentar-se durante o manuseio do produto.
- Evitar que o conteúdo entre em contato com os dedos. Se isto ocorrer, lavar as mãos com água e sabão.
- Não reutilizar as embalagens vazias. As mesmas devem ser descartadas no lixo doméstico.

LIMITAÇÕES DE USO

- Não tratar filhotes de cães com menos de 3 meses de idade.
- Não usar em animais doentes (por exemplo, com doenças sistêmicas, febre) ou convalescentes.

Apresentação: Pipetas de polietileno nas apresentações de 0,67 mL, 1,34 mL, 2,68 mL e 4,02 mL.

Conservação: Conservar em local fresco e seco, à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 10.025/2015 em 31/03/2015.

Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação



0260-0715

Proprietário:

CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.

Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP

Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659

CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira

®Marca Registrada - www.chemitec.com.br

Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413

Fabricante: Vetecia Lab. de Prod. Vet. Ltda.

R. Dr. Alfredo Ramos, nº 236 - Jacareí/SP

CNPJ (MF): 07.685.131/0001-07