

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Não administrar junto a outros anti-inflamatórios esteroides e não esteróides. Os anti-inflamatórios esteroides podem agravar os efeitos gastrointestinais.
- Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Streptomycina, Gentamicina, Kanamicina e Neomicina).
- Não administrar junto com anticoagulantes.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos Oxicans e não possui antídoto específico. No caso de intoxicação e superdosagem sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Apresentação: Elo-xicam Injetável 0,2% é apresentado sob a forma de solução injetável, acondicionado em frasco de 20 mL. Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto utilizar o produto no prazo máximo de 21 dias. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário. Licenciado provisoriamente no MAPA sob o nº 6/2017.

Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



0328-0817

Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
 Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
 Tel.: (11) 2274-7022
 CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
 *Marca Requerida - www.chemitec.com.br
 Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
 Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.
 R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
 CNPJ: 50.472.547/0001-68

Elo-xicam[®]

Injetável 0,2%

Solução Injetável

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos.

**Eficácia com ação prolongada,
sem complicações gástricas.**

Fórmula - Cada 100 mL contém:
 Meloxicam 0,2 g
 Veículo q.s.p. 100 mL

INDICAÇÕES:

Elo-xicam Injetável 0,2% é um potente anti-inflamatório não esteroide, inibidor de tromboxanas e prostaglandinas, com excelentes propriedades antipirética e analgésica. O Meloxicam é considerado inibidor preferencial da cicloxigenase - 2 (COX 2) (seletivo), resultando em menores efeitos colaterais e sem complicações gástricas, por um período maior de tratamento. **Elo-xicam Injetável 0,2%** é indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos, nas patologias dolorosas agudas. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Linha ChemiPet[®]

Linha ChemiPet[®]

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar por via subcutânea.

DOSE PARA CÃES:

Primeiro dia de tratamento:	1,0 mL de Elo-xicam Injetável 0,2% para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).
------------------------------------	---

Segundo dia de tratamento:	0,5 mL de Elo-xicam Injetável 0,2% para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).
-----------------------------------	---

Elo-xicam Injetável 0,2% deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se até duas aplicações consecutivas.

A duração do tratamento deverá ser determinada conforme orientação do Médico Veterinário e/ou de acordo com a gravidade da patologia.

DOSE PARA GATOS:

Dose Única	0,15 mL de Elo-xicam Injetável 0,2% para cada 1 kg de peso corporal (0,3 mg de meloxicam por kg de peso corporal).
-------------------	---

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES

- Cães e gatos com histórico de distúrbios gastrointestinais ou doenças renais, cardíacas e hepáticas apresentam maior risco de desenvolver efeitos adversos;
- A segurança em fêmeas gestantes não foi estabelecida;
- Não recomendamos aplicações consecutivas de Meloxicam injetável em gatos;
- **Elo-xicam Injetável 0,2%** não deve ser indicado para animais com hipersensibilidade ao ativo Meloxicam.

PRECAUÇÕES DE USO

- Devem-se respeitar as recomendações gerais para o uso de produtos por via parenteral, como as de assepsia e desinfecção no momento da administração subcutânea;
- Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos, ou hipotensos, devido ao risco de desenvolvimento de toxicidade renal;
- A higiene é fundamental; lavar as mãos antes e após a manipulação do produto;
- Obedecer às dosagens e a via de administração indicada na posologia deste produto;
- Obedecer às contraindicações e limitações de uso do produto;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Atentar para o prazo de validade do produto após a abertura da embalagem;
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS

- Podem ocorrer reações adversas como perda de apetite, diarreias e vômitos; nestes casos interromper o tratamento.
- Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do Meloxicam são raros, no entanto, o Médico Veterinário deve estar atento à possibilidade da ocorrência.